

Informationen zur Klausur am Donnerstag, dem 9.2.2017

- Bitte bringen Sie einen Studentenausweis mit zur Klausur!
- Die Klausur findet im üblichen Vorlesungshörsal (Gebäude INF 230) statt.
- Die Klausur startet **pünktlich um 14:00 Uhr** und endet **pünktlich um 16:00 Uhr**. Also bitte am besten schon 10 Minuten vorher eintreffen und Platz nehmen!
- Alle Handys/Smartphones sind auszuschalten! Taschen sind vorne auf dem Podium des Hörsaals abzulegen. Es dürfen nur Schreibutensilien, der Ausweis und Getränke an den Platz mitgenommen werden.
- Die Aufgabenblätter werden ausreichend sein, um Nebenrechnungen zu machen. Eigene Schmierzettel werden also nicht notwendig sein.
- Als Hilfsmittel darf ein beidseitig **handbeschriebenes** DIN-A4-Blatt verwendet werden.
- Es wurden automatisch jeder zur Klausur angemeldet. Wer die Zulassungsbedingungen der Übungsgruppe erfüllt hat ist damit **automatisch zu der Klausur angemeldet** im Sinne der Studienordnung und muss nichts mehr tun. Wer **nicht** an der Klausur teilnehmen möchte muss sich in MÜSLI von der Klausur abmelden.
- Wer bereits eine Zulassung aus früheren Semestern hat soll überprüfen ob er für die Klausur angemeldet und zugelassen ist. Sollte das nicht der Fall sein bitte einfach eine Email an rene.hess@iwr.uni-heidelberg.de schreiben.
- Der Termin und der Ort für die Nachklausur wird noch bekanntgegeben. An dieser dürfen nur Studenten teilnehmen, welche an der ersten Klausur teilgenommen, aber nicht bestanden oder entschuldigt gefehlt haben. Der Termin wird voraussichtlich in der Woche vor Ostern (10.-13. April) stattfinden.

Übung 1 *Eigenschaften der kubischen Spline Interpolation*

Auf dem Interval $I = [0, 2]$ seien die Knoten $x_0 = 0, x_1 = 1$ und $x_2 = 2$ gegeben, $X = \{x_0, x_1, x_2\}$. Sei $S(X)$ der Vektorraum der kubischen Splines mit **natürlichen** Randbedingungen.

- a) Welche der folgenden Funktionen liegen im $S(X)$? Begründen Sie ihre Antwort.

$$f_1(x) = x^2(x - 6) - (x - 2)^2,$$

$$f_2(x) = \max\{0, x - 1\}^3 - \frac{1}{2}x^3,$$

$$f_3(x) = x^3 - x^2.$$

- b) Bestimmen Sie den interpolierenden Spline $s \in S(X)$ von $f(x) = x^3$.

(5 Punkte)

Übung 2 *Fehler der kubischen Spline Interpolation*

Gegeben seien eine äquidistante Zerlegung $X = (x_0, \dots, x_N)$ des Intervalls $[0, 1]$ mit $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{N-1} < x_N = 1$, es gilt also $h = x_j - x_{j-1}$ für $j = 1, 2, \dots, N$, mit $h = 1/N$.

Betrachten Sie auf diesem Intervall die Funktion $f(x) = \sin(2\pi x)$ und die zugehörige interpolierende kubische Splinefunktion $s \in S$ mit natürlichen Randbedingungen.

Wie groß muss die Zahl N gewählt werden, damit auf dem gesamten Intervall die Differenz zwischen s und f betragsmäßig kleiner als 10^{-12} ausfällt?

(2 Punkte)

Übung 3 *Trigonometrische Interpolation*

- Bestimmen Sie die Koeffizienten c_0, \dots, c_3 der komplexen trigonometrischen Interpolation der konstanten Funktion $f(x) = 1$ zu den vier Stützstellen $x_j = \frac{2\pi j}{4}, j = \{0, \dots, 3\}$.
- Welche der Koeffizienten sind ungleich 0? Entspricht das Ihren Erwartungen?

(5 Punkte)

Übung 4 *Kubische Splines (Praktische Übung)*

- Schreiben Sie eine C++Funktion `getCubicSpline(...)`, die ausgehend von Stützstellen

$$x_0 < x_1 < \dots < x_n$$

und zugehörigen Stützwerten y_0, y_1, \dots, y_n die Koeffizienten $a_k^{(i)}, k = 0, \dots, 3, i = 1, \dots, n$ des natürlichen kubischen Interpolationssplines s ,

$$s(x) = a_0^{(i)} + a_1^{(i)}(x - x_i) + a_2^{(i)}(x - x_i)^2 + a_3^{(i)}(x - x_i)^3 \quad \text{für } x \in [x_{i-1}, x_i],$$

berechnet. Zur Lösung des linearen $(n - 1) \times (n - 1)$ Gleichungssystems (siehe Vorlesung)

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_2 & 0 & \dots & 0 \\ c_1 & a_2 & b_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & c_{n-3} & a_{n-2} & b_{n-1} \\ 0 & \dots & 0 & c_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_2^{(1)} \\ a_2^{(2)} \\ \vdots \\ a_2^{(n-2)} \\ a_2^{(n-1)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} \end{pmatrix}$$

können Sie die bereits vorhandenen Funktionen zur LR-Zerlegung verwenden oder (4 Bonuspunkte) einen schnelleren Löser schreiben, welcher die tridiagonale Struktur der Matrix ausnutzt.

Input-Parameter: x_i, y_i Output-Parameter: $a_k^{(i)}, k = 0, \dots, 3, i = 1, \dots, n$

- Schreiben Sie eine zweite Funktion `evaluateCubicSpline(...)`, die den in 1. berechneten Spline s an einer beliebigen Stelle $x \in [x_0, x_n]$ auswertet. Ausgegeben werden soll der Wert des Splines $s(x)$ bei Eingabe von $x_0, \dots, x_n, a_k^{(i)}$ für $i = 1, \dots, n, k = 0, \dots, 3$ sowie eines Auswertepunktes x .
- Testen Sie ihre Funktionen an folgendem höchst realistischen Beispiel:

Die Geologen der Universität Heidelberg brauchen Ihre Hilfe. Auf der schwäbischen Alb wurden die Überreste von Versteinerungen gefunden, die zu einem Saurierskelett gehören. Um die Umriss des Sauriers rekonstruieren zu können, wird das 14 mal 5 Meter große Fundgebiet mit einem Raster überzogen und jedes Fundstück Dinosaurierhaut in diesem Koordinatensystem lokalisiert. Nach einer logischen Reihung ergibt sich folgende Tabelle von Fundkoordinaten (x_i, y_i) für die von 0 bis 12 nummerierten Fundstücke:

Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x_i	3.75	3.75	2.25	1.25	0.25	0.75	4.00	5.50	6.25	9.00	12.50	12.75	12.25
y_i	0.25	1.50	3.25	4.25	4.65	4.83	2.50	3.25	3.65	3.00	1.25	2.15	3.50

Gehen Sie zur Rekonstruktion des Sauriers folgendermaßen vor: Die Gestalt des Sauriers wird durch eine Kurve

$$t \mapsto \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \psi(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad t \in [0, T]$$

beschrieben, wobei die Funktionen φ und ψ durch je einen Spline genähert werden. Da das Durchlaufen der Kurve „mit konstanter Geschwindigkeit“ geschehen soll, läßt man die Bogenlänge der Kurve einfließen, indem man als Stützstellen die Werte

$$t_0 := 0, \quad t_i := t_{i-1} + \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} \quad \text{für } i = 1, \dots, 12$$

benutzt. Berechnen Sie mit Ihrer Prozedur aus 1. einen Spline s_φ mit Stützstellen t_i und Stützwerten x_i sowie einen weiteren Spline s_ψ mit Stützstellen t_i und Stützwerten y_i . Die genäherte Gestalt des Sauriers ergibt sich dann aus der Kurve

$$t \mapsto \begin{pmatrix} s_\varphi(t) \\ s_\psi(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \quad t \in [t_0, t_{12}]$$

Werten Sie diese Kurve mit Ihrer Prozedur aus 2. an den Stellen $t = \xi_j := \frac{t_{12}}{100} \cdot j$, $j = 0, 1, \dots, 100$ aus, und fertigen Sie eine (grobe) Skizze des Sauriers an, z.B. mit gnuplot.

Hinweise:

- Sie können den Spline in gnuplot visualisieren, wenn Sie die Ergebnisse in eine Datei schreiben, bei der in jeder Zeile ein Wertepaar $x \ y$ steht:

```
plot "test.dat" using 1:2 with lines
```

- Erste Expertisen vermuten einen weiblichen Brontosaurus mittleren Alters.

(8 (+ 4 Bonus) Punkte)